




Tumor-First werkwijze

bij ovariumcarcinoom



Patient met verdenking ovariumcarcinoom



Gynaecologisch oncoloog

- Geeft voorlichting aan patiënt over de tumortest ([informatiepagina](#))
- Reikt [informatiebrief](#) over de tumortest uit of verwijst naar website indien behoefte
- Documenteert in het EPD (in het kader van Tumor-First):
 - patiënt is geïnformeerd en stemt in met de tumortest ([smartphrase](#))
 - familieanamnese ([verwijs checklist](#))
- Stuurt tumorweefsel in voor standaard pathologische diagnostiek
 - indien bezwaar tumortest dit documenteren op aanvraagformulier (Opt-Out)

6 weken later


Gynaecologisch oncoloog

- Bespreekt uitslag tumortest met patiënt en geeft bijbehorende uitslagbrief mee ([voorbeeldbrief](#))
- Documenteert in EPD dat patiënt is geïnformeerd over de uitslag van de tumortest
- Koppelt uitslag tumortest terug naar huisarts en medisch oncoloog
- Verwijst afhankelijk van testuitslag en familieanamnese door naar klinisch genetica ([verwijs checklist](#))



Klinisch geneticus

Indien positieve tumortest
en/of familieanamnese




Laboratorium (UMC/NKI)

- Voert tumortest uit op tumorweefsel
- Interpreteert resultaten tumortest (samenwerking KMBP + LSKG)
- Verwerkt uitslag tumortest in rapportage voor PA verslag ([leidraad](#))
- Stuurt uitslagformulier van de tumortest naar de patholoog

Patholoog

- Stelt diagnose ovarium/tubacarcinoom
- Controleert of patiënte geen bezwaar heeft tegen het uitvoeren van de tumortest (opt-out)
- Controleert in PALGA of tumortest eerder succesvol is uitgevoerd
- Vraagt tumortest aan ([leidraad](#))
- Stuurt tumorweefsel met aanvraagformulier naar laboratorium



Patholoog

- Ontvangt uitslagformulier van tumortest
- Verwerkt uitslag tumortest in PALGA
- Stelt conclusietekst voor clinici op ([conclusietekst](#))
- Keurt PALGA rapport goed voor koppeling EPD